

KRZTUSIEC?



Nie ryzykuj!

Krztusiec objawia się przewlekłym, napadowym kaszlem, który może trwać nawet do 12 tygodni.¹

Zachorować może każdy, a wraz z wiekiem rośnie ryzyko groźnych powikłań.²



Szczepienia przeciwko krztuścowi zalecane są **wszystkim osobom dorosłym** w postaci pojedynczej dawki przypominającej co **10 lat**.³

Jedna dawka szczepionki stanowi również profilaktykę tężca i błonicy.³

ZAPYTAJ LEKARZA O SZCZEPIENIE!



Dowiedz się więcej na
www.KrztusiecNieRyzykuj.pl

5

POWODÓW, aby zadbać o profilaktykę krztusca u dorosłych

1

NA KRZTUSIEC CHORUJĄ TEŻ DOROŚLI⁴



na krztusiec można zachorować
w każdym wieku⁴



ponad połowa przypadków
dotyczy osób powyżej 15 r.ż.⁴

2

KRZTUSIEC JEST BARDZO ZARAŻLIWY⁵



krztusciem łatwiej się
zakazić niż np. grypą⁵



jeden chory zakaża
nawet do 17 osób⁵

3

KRZTUSIEC U DOROŚŁYCH JEST TRUDNY DO ROZPOZNANIA, A LICZBA PRZYPADKÓW JEST WYSOKO NIEDOSZACOWANA^{6,7}



objawy krztusca
u dorosłych mogą być
niecharakterystyczne⁶



na jeden rozpoznany przypadek krztusca
w całej populacji może przypadać nawet
71 niezdiagnozowanych zachorowań⁴

4

KRZTUSIEC U DOROŚŁYCH MOŻE BYĆ BARDZO UCIAŻLIWY¹

Może mieć formę napadów silnego, duszącego kaszlu, zakończonego charakterystycznym świstem krtaniowym a nawet wymiotami.⁷



kaszel trwa
nawet do
3 miesięcy¹



MOŻE GROZIĆ POWIKŁANIAMI TAKIMI JAK:²



zapalenie płuc przepuklina nietrzymanie moczu złamanie żeber

5

CHORUJĄC NA KRZTUSIEC JESTEŚMY POTENCJALNIE ŚMIERTELNYM ZAGROŻENIEM DLA NIEUODPORNIONYCH NIEMOWLĄT⁶



Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Krztusiec - nie ryzykuj, organizowanej przez firmę GSK we współpracy z Fundacją My Pacjenci. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.

GSK

MY
FUNDACJA
MY PACJENCI

Referencje: 1. CDC. Pertussis: <https://www.cdc.gov/pertussis/about/signs-symptoms.html> (dostęp: 11.2021). 2. Riffelmann M et al. Dtsch Arztebl Int 2008;105(37):623-628 3. Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2022 http://dziennikmz.gov.pl/DUM_MZ/2021/85/akt.pdf (dostęp luty 2022). 4. NIZP-PZH. [https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/krztusiec?strona=3#jak-wiele\[1\]zachorowan-na-krztusiec-wystepuje-w\[1\]polsce](https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/krztusiec?strona=3#jak-wiele[1]zachorowan-na-krztusiec-wystepuje-w[1]polsce). (dostęp: 02.2022). 5. Biggerstaff M, et al. BMC Infect Dis. 2014;14:480. 6. Kuchar E. Krztusiec. <https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/choroby/zakazenia-bakteryjne/158166.krztusiec> (dostęp: 02.2022). 7. Medycyna Praktyczna. Szczepienia 2/2018, Szczepienie przypominające młodzieży i dorosłych przeciwko krztuscowi. Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: (22) 492-13-01, fax: (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy. GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 00-697 Warszawa, tel.: 0 22 576 90 00 fax: 0 22 576 90 01 NP-PL-PTX-LBND-220001 Luty 2022 pl.gsk.com